




# قائمة تحقق PERIPrem للأطفال

اكتمل

قيد التقدم



أنا في المستشفى المناسب في حال ولد طفلي (أطفالي) مبكرًا.



**المكان الأنسب  
للولادة**

(للمواليد الأقل من 27 أسبوعًا، أو أقل من 28 أسبوعًا وذلك بالنسبة إلى تعدد المواليد أو من يبلغ وزنهم أقل من 800 جرام)

اكتمل

قيد التقدم



لقد تلقيت مجموعة كاملة من الستيرويدات للمساعدة في تحضير طفلي (أطفالي) للولادة المبكرة.



**ستيرويدات  
ما قبل الولادة**

(لجميع المواليد الأقل من 34 أسبوعًا)

اكتمل

قيد التقدم



لقد تلقيت كبريتات المغنيسيوم لدعم نمو الدماغ لدى طفلي (أطفالي).



**كبريتات المغنيسيوم  
ما قبل الولادة**

(لجميع المواليد الأقل من 30 أسبوعًا)

اكتمل

قيد التقدم



لقد تلقيت معلومات حول فوائد حليب الأم المبكر وقد تم شرح تقنيات الشفط باليد/مضخة الثدي لمساعدتي في محاولة الحصول على حليب الأم مبكرًا لطفلي (أطفالي) قبل أو خلال ساعة من ولادتهم.



**حليب الأم  
المبكر**

(لجميع المواليد الأقل من 34 أسبوعًا)

اكتمل

قيد التقدم



تلقيت مضادات حيوية لتقليل فرصة إصابة طفلي بعدوى تُسمى البكتيريا العقدية من المجموعة ب.



**المضادات الحيوية**

(لجميع المواليد الأقل من 34 أسبوعًا حيث كانت الأم في حالة مخاض)

اكتمل

قيد التقدم



بعد ولادة طفلي (أطفالي)، سيقوم الفريق المتخصص كلما أمكن، بدعمه لتأمين وصول دم إضافي عبر المشيمة للمساعدة في حمايته، لمدة دقيقة على الأقل قبل ربط الحبل السري.



**العناية المثلى بالحبل  
السري**

(لجميع المواليد الأقل من 34 أسبوعًا)



# قائمة تحقق PERIPrem للأطفال

قيد التقدم

اكتمل



بعد ولادة طفلي (أطفالي)، سيجاول الفريق المتخصص الحفاظ على درجة حرارته بين 36.5 درجة مئوية و37.5 درجة مئوية، وسيساعدني في حمل طفلي واحتضانه بمجرد أن يكون ذلك آمنًا ويمكن القيام بذلك على نحو مخطط ومدعوم.



## العناية بالحرارة


(لجميع المواليد الأقل من 34 أسبوعًا)

قيد التقدم

اكتمل



إذا كانوا بحاجة إلى أنبوب وجهاز تنفس صناعي لمساعدتهم على التنفس، فسيتولى فريق حديثي الولادة حماية رئتي طفلي (أطفالي) باستخدام الإعدادات الخاصة لجهاز التنفس.



## العناية بالتنفس

(لجميع المواليد الأقل من 34 أسبوعًا ممن قد يحتاجون ذلك)

قيد التقدم

اكتمل



لقد تم إعطاء طفلي (أطفالي) الكافيين لحماية دماغه ومساعدته على التنفس.



## الكافيين

(لجميع المواليد الأقل من 30 أسبوعًا ولبعض المواليد الأقل من 34 أسبوعًا أو من يبلغ وزنهم أقل من 1500 جرام)

قيد التقدم

اكتمل



لقد تم إعطاء طفلي (أطفالي) دواء بروبيوتيك الذي يحتوي على بكتيريا نافعة في اليوم الأول من ولادته للمساعدة في حماية أمعائه.



## البروبيوتيك

(للمواليد الأقل من 32 أسبوعًا أو من يبلغ وزنهم أقل من 1500 جرام)

قيد التقدم

اكتمل



لقد تم إعطاء طفلي (أطفالي) الهيدروكورتيزون في اليوم الأول من ولادته لمساعدة رئتيه على العمل، لأنه ولد مبكرًا جدًا.



## العلاج الوقائي بالهيدروكورتيزون

(للمواليد الأقل من 28 أسبوعًا)