

# PERIPrem kūdikio pasas



## Tinkama gimimo vieta

(kūdikiams, gimusiems anksčiau nei 27 savaitę, anksčiau nei 28 savaitę esant daugiavaisiam nėštumui arba tiems, kurie gali sverti mažiau nei 800 gramų)



Esu tinkamoje ligoninėje, jei mano kūdikiui (-iams) reikia gimti anksti.

Vykdoma

Atlikta



## Antenataliniai steroidai

(visiems kūdikiams, kurie gimė anksčiau nei 34 savaitę)



Gavau visą gydymo steroidais kursą, norint padėti pasirengti mano kūdikiui (-ių) ankstyvam gimimui.

Vykdoma

Atlikta



## Antenatalinis magnio sulfatas

(visiems kūdikiams, kurie gimė anksčiau nei 30 savaitę)



Gavau magnio sulfato, kad padėtų mano kūdikiui (-ių) smegenų vystymuisi.

Vykdoma

Atlikta



## Ankstyvasis motinos pienas

(visiems kūdikiams, kurie gimė anksčiau nei 34 savaitę)



Gavau informacijos apie ankstyvojo motinos pieno naudą ir man parodė spaudimo rankomis / krūties pumpavimo būdų, kurie padėtų man pagaminti ankstyvojo pieno prieš kūdikiui (-iams) gimstant ar per valandą jam (jiems) gimus.

Vykdoma

Atlikta



## Antibiotikai

(visiems kūdikiams, kurie gimė anksčiau nei 34 savaitę, kai motinai buvo prasidėjęs gimdymas)



Gavau antibiotikų, kad sumažėtų galimybė mano kūdikiui susirgti infekcija, vadinama B grupės streptokoku.

Vykdoma

Atlikta



## Optimalus virkštelės valdymas

(visiems kūdikiams, kurie gimė anksčiau nei 34 savaitę)



Gimus mano kūdikiui (-iams), jei tik įmanoma, mažiausiai vieną minutę prieš virkštelės nukirpimą, specialistų grupė padės jam (jiems) gauti papildomą perpylimą iš placentos, kad padėtų jį (juos) apsaugoti.

Vykdoma

Atlikta



# PERIPrem kūdikio pasas



## Terminė priežiūra

(visiems kūdikiams, kurie gimė anksčiau nei 34 savaitę)



Gimus mano kūdikiui (-iams) specialistų grupė bandys išlaikyti jo (jų) kūno temperatūrą nuo 36,5 °C iki 37,5 °C, ir padės man priglausti savo kūdikį prie savęs (oda į odą), kai tik bus saugu daryti tai planuotai ir gaunant paramą.

Vykdoma




Atlikta



## Kvėpavimo valdymas

(visiems kūdikiams, kurie gimė anksčiau nei 34 savaitę, kuriems gali to reikėti)



Jei jiems reikės vamzdelio ar ventilacijos aparato, kad padėtų jiems kvėpuoti, naujagimių grupė apsaugos mano kūdikio (-ių) plaučius, naudodama specialų ventiliavimo prietaisą.

Vykdoma



Atlikta



## Kofeinas

(visiems kūdikiams, kurie gimė anksčiau nei 30 savaitę, ir kai kuriems kūdikiams, kurie gimė anksčiau nei 34 savaitę, ir kurie sveria mažiau kaip 1 500 gr)



Mano kūdikiui (-iams) buvo duota kofeino, kad apsaugotų jo (jų) smegenis ir padėtų jam (jiems) kvėpuoti.

Vykdoma



Atlikta



## Probiotikai

(kūdikiams, kurie gimė anksčiau nei 32 savaitę arba kurie sveria mažiau nei 1 500 gr)



Pirmą gyvenimo dieną mano kūdikiui (-iams) buvo duota probiotikų su gerosiomis bakterijomis, kad apsaugotų jo (jų) žarnyną.

Vykdoma



Atlikta



## Profilaktinis hidrokortizonas

(kūdikiams, kurie gimė anksčiau nei 28 savaitę)



Pirmą gyvenimo dieną mano kūdikiui (-iams) buvo duota hidrokortizono, kad apsaugotų jo (jų) plaučius, kadangi jis (jie) gimė labai anksti.

Vykdoma



Atlikta

