


# Karta PERIPrem dziecka



## Odpowiednie miejsce urodzenia dziecka

(dotyczy dzieci urodzonych przed 27. tygodniem ciąży, przed 28. tygodniem w przypadku porodów mnogich lub jeśli masa ciała może wynosić poniżej 800 g)



Jestem w odpowiednim szpitalu na wypadek gdyby moje dziecko musiało / dzieci musiały urodzić się wcześniej.


W trakcie

Zakończono



## Steroidoterapia przedporodowa

(dotyczy wszystkich dzieci urodzonych przed 34. tygodniem ciąży)



Otrzymałam pełen kurs steroidów w sytuacji zagrożenia przedwczesnym porodem.

W trakcie

Zakończono



## Siarczan magnezu przed porodem

(dotyczy wszystkich dzieci urodzonych przed 30. tygodniem ciąży)



Otrzymałam siarczan magnezu, aby wspomóc rozwój mózgu mojego dziecka / moich dzieci.

W trakcie

Zakończono



## Podanie siary (pierwszego mleka)

(dotyczy wszystkich dzieci urodzonych przed 34. tygodniem ciąży)



Otrzymałam informacje o zaletach siary i pokazano mi, jak ręcznie odciągać pokarm / używać laktatora, abym mogła odciągnąć siarę dla mojego dziecka / moich dzieci przed lub w ciągu godziny od porodu.

W trakcie

Zakończono



## Antybiotyki

(dotyczy wszystkich dzieci urodzonych przed 34. tygodniem ciąży, których matka była w trakcie porodu)



Otrzymałam antybiotyki, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia mojego dziecka paciorkowcami z grupy B.

W trakcie

Zakończono



## Optymalne postępowanie z pępowiną

(dotyczy wszystkich dzieci urodzonych przed 34. tygodniem ciąży)



Po urodzeniu dziecka/dzieci, jeśli będzie to możliwe, zespół specjalistów odczeka z zaciśnięciem pępowiny co najmniej minutę, aby umożliwić napływ dodatkowej krwi z łożyska do krwioobiegu dziecka, wspomagając organizm.

W trakcie

Zakończono



# Karta PERIPrem dziecka



## Ochrona przed utratą ciepła

(dotyczy wszystkich dzieci urodzonych przed 34. tygodniem ciąży)



Po narodzinach dziecka/dzieci profesjonalny zespół podejmie starania, aby utrzymać temperaturę ciała w przedziale 36,5°C–37,5°C i umożliwi kontakt „skóra do skóry”, gdy będzie to bezpieczne, w zaplanowany sposób, z odpowiednim wsparciem.

W trakcie




Zakończono



## Wsparcie oddechowe

(dotyczy wszystkich dzieci urodzonych przed 34. tygodniem ciąży, które mogą tego potrzebować)



Jeśli konieczne będzie podłączenia rurki i respiratora, aby wspomóc oddech, zespół neonatologiczny będzie chronić płuca mojego dziecka / moich dzieci poprzez użycie respiratora w odpowiednim ustawieniu.

W trakcie



Zakończono



## Kofeina

(dotyczy wszystkich dzieci urodzonych przed 30. tygodniem ciąży oraz niektórych dzieci urodzonych przed 34. tygodniem ciąży lub o masie ciała poniżej 1500 g)



Mojemu dziecku / moim dzieciom podano kofeinę w celu ochrony mózgu i wspomagania oddechu.

W trakcie



Zakończono



## Probiotyki

(dotyczy dzieci urodzonych przed 32. tygodniem ciąży lub o masie ciała poniżej 1500 g)



W pierwszym dniu życia moje dziecko/ dzieci otrzymało/otrzymały lek probiotyczny zawierający pożyteczne bakterie, aby chronić jelita.

W trakcie



Zakończono



## Profilaktyczne podawanie hydrokortyzonu

(dotyczy dzieci urodzonych przed 28. tygodniem ciąży)



Ze względu na przedwczesny poród moje dziecko/dzieci otrzymało/otrzymały hydrokortyzon w pierwszym dniu życia, aby wspomóc płuca.

W trakcie



Zakończono

